



Введення назофарингеального повітропроводу (NPA)




01 **ПОКЛАДІТЬ** пораненого на спину, а його голову у нейтральне положення




02 **ОГЛЯНЬТЕ** ніс на наявність будь-яких перешкод, які б завадили використанню повітропроводу




03 **ВІДКРИЙТЕ** NPA, який є у аптечці пораненого




04 **ЗМАСТИТЬ** кінець повітропроводу стерильним лубрикантом на водній основі з аптечки або водою




05 **ВІДКРИЙТЕ** отвір правої ніздрі пораненого відтягуючи кінчик носа вгору




06 **РОЗТАШУЙТЕ** повітровід скошеним кінчиком до середини носа (тобто до перетинки носа)



07 **ВСТАВТЕ** NPA у праву ніздрю (під кутом 90 градусів до обличчя пораненого)



Плавними рухами **ПРОСУВАЙТЕ** NPA в напрямку до ніг (а не до голови)...



... доки фланцевий кінець не зрівняється з ніздрею


ОБЕРЕЖНО: Ніколи не використовуйте силу при введенні NPA в ніздрю. Якщо виникає опір, спробуйте легким погойдуванням відтягнути повітропровід і обережно знову вставити. Якщо повітропровід введений, але пацієнт починає задихатися або давити, злегка потягніть NPA назад і залиште його на місці. Якщо не вдається вставити NPA в праву ніздрю, повністю витягніть NPA і спробуйте вставити його в ліву ніздрю.



08 **ОЦІНІТЬ** дихання за допомогою техніки **БАЧУ, ЧУЮ, ВІДЧУВАЮ**



09 **Посадіть** або **переверніть** пораненого у положення для відновлення



10 **Задokumentуйте** огляд та лікування у формі DD 1380 TCCC