Translated by tccc.org.ua

CLS TCCC | CMC TCCC | CPP TCCC

**COMBAT LIFESAVER**
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

M A R C H

# НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ ПОВІТРОВІД (NPA)




ПОКЛАДІТЬ пораненого на спину, розташувавши його голову в нейтральному положенні.

ОГЛЯНЬТЕ ніс та носові ходи на наявність будь-яких перешкод, які можуть завадити введенню повітропроводу.




РОЗПАКУЙТЕ назофарингеальний повітровід, що міститься в тактичній індивідуальній аптечці пораненого.




ЗМАСТІТЬ кінець повітроводу стерильним лубрикантом на водній основі (з тактичної індивідуальної аптечки бійця) або водою.




ВІДКРИЙТЕ для введення повітроводу отвір правої ніздрі пораненого, злегка піднявши кінчик його носа доверху (“задеріть ніс”).

РОЗТАШУЙТЕ повітровід скошеним кінчиком до носової перегородки (вона знаходиться всередині носа і розділяє дві ніздрі).




ВСТАВТЕ повітровід у праву ніздрю (під кутом 90 градусів до обличчя пораненого).

Плавними рухами ВВОДЬТЕ повітровід донизу, у напрямку поверхні землі (а не доверху, до маківки голови) ...

доки дистальний кінець не зрівняється з ніздрею.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Ніколи не використовуйте силу при введенні NPA в ніздрю. Якщо виникає опір, спробуйте, злегка прокручуючи, відтягнути повітропровід назад і знову обережно ввести. Якщо повітровід введено успішно, але пацієнт починає давитися або хоче блювати, злегка відтягніть NPA назад і залиште його введеним. Якщо не вдається успішно ввести NPA в праву ніздрю, повністю витягніть його і спробуйте ввести в ліву ніздрю.

ПОВТОРНО ОЦІНІТЬ дихання за допомогою техніки БАЧУ, ЧУЮ, ВІДЧУВАЮ.




ПОСАДІТЬ пораненого або переведіть його у стабільне бокове положення.




ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.