


НАЗОФАРИНГЕАЛЬНИЙ ПОВІТРОВІД (NPA)



ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.



01 **ПОКЛАДІТЬ** пораненого на спину, розташувавши його голову в нейтральному положенні.



02 **ОГЛЯНЬТЕ** ніс та носові ходи на наявність будь-яких перешкод, які можуть завадити введенню повітропроводу.



03 **РОЗПАКУЙТЕ** назофарингеальний повітровід, що міститься в тактичній індивідуальній аптечці пораненого.
ПРИМІТКА: Стандартний NPA (розмір 32 Fr), який міститься в більшості аптечок, підходить для військовослужбовців середньої тілобудови.



04 **ЗМАСТІТЬ** кінець повітропроводу стерильним лубрикантом на водній основі (з тактичної індивідуальної аптечки бійця) або водою.


ПРИМІТКА ДО КРОКУ 4: Не використовуйте кров або речовини не на водній основі, однак можете використовувати слину пораненого (не вапу).




05 **ВІДКРИЙТЕ** для введення повітропроводу отвір *правої* ніздрі пораненого, злегка піднявши кінчик його носа доверху.




06 **РОЗТАШУЙТЕ** повітровід скошеним кінчиком до носової перегородки.



07 **ВСТАВТЕ** NPA у праву ніздрю (під кутом 90 градусів до обличчя пораненого)...




...зі скошеним кінчиком, спрямованим до середини носа. Плавними рухами **ВВОДЬТЕ** NPA,...



...доки дистальний кінець не зрівняється з ніздрюю; вводьте в напрямку поверхні землі, а не маківки голови.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Ніколи не використовуйте силу при введенні NPA в ніздрю. Якщо виникає опір, спробуйте, злегка прокручуючи, відтягнути повітропровід назад і знову обережно ввести. Якщо повітровід введено успішно, але пацієнт починає задихатися або давитися, злегка відтягніть NPA назад і залиште його введеним. Якщо не вдається успішно ввести NPA в праву ніздрю, повністю витягніть його і спробуйте ввести в *ліву* ніздрю. При введенні в ліву ніздрю, вам потрібно буде повернути NPA після того, як він зайде приблизно на 5 см в носовий хід пораненого, щоб вигин NPA був спрямований дугою вниз.



08 **ПОВТОРНО ОЦІНІТЬ** дихання за допомогою техніки **БАЧУ, ЧУЮ, ВІДЧУВАЮ**.



09 **ПОСАДІТЬ** пораненого або переведіть його у стабільне бокове положення. **ПОКЛАДІТЬ** неспритомного пораненого у стабільне бокове положення з метою запобігання аспірації крові, слизу чи блювоти.



10 **ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ** результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.