

НАКЛАДАННЯ ТИСНУЧОГО БАНДАЖА



01
Вийміть бандаж з упаковки.



02
Розмістіть подушку бандажа безпосередньо над ранною, застосовуючи тиск.



03
Огорніть еластичний бандаж навколо кінцівки, утримуючи тиск.



04
Протягніть бинт крізь пластиковий елемент тиску.



05
Огортайте бандаж у зворотньому напрямку поверх елемента тиску.




06
Міцно **ОГОРНІТЬ** бандаж навколо пластикового елемента тиску до повного закриття країв подушки.



07
Закріпіть гачок фіксуючого елемента за один з обертів бандажу.



08
Оцініть кровообіг під пов'язкою, перевіривши пульс нижче поранення; за потреби – послабте бандаж.



09
Задokumentуйте надану допомогу у Картці пораненого TCCC.



10
Повідомте медичний персонал про надану допомогу.

ВІДНОВЛЕННЯ ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ. СТАБІЛЬНЕ БОКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ



01
Покладіть пораненого на тверду, рівну поверхню.



02
Станьте навколiшки біля пораненого.



03
Відкрийте рот постраждалого, видаляйте сторонні тіла. **НЕ ПРОВІДЬТЕ** маніпуляцію наосліп.




04a
За відсутності підозри травми шії та хребта виконайте **ЗАКІДАННЯ ГОЛОВИ НАЗАД ТА ВИВЕДЕННЯ ПІДБОРІДДЯ**.

1) Зафіксуйте голову назад, рукою підтримуйте підборіддя.
2) Висуньте нижню щелепу вперед так, щоб зуби обох щелеп знаходились на одному рівні.



04b
При підозрі травми хребта/ший виконайте **ВИСУВАННЯ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ**.

1) Станьте за головою постраждалого, упершись ліктями в підлогу.
2) Зафіксуйте голову пораненого, покладіть пальці на вигин нижньої щелепи.
3) Вказівними пальцями підніміть нижню щелепу та висуньте її вперед великими пальцями.




05
ПОВТОРНО ОЦІНІТЬ дихання за алгоритмом «БАЧУ, ЧУЮ, ВІДЧУВАЮ»!



06
Якщо поранений **ПРИТОМНИЙ** – розмістіть його у положі **СІДЯЧИ** або у **СТАБІЛЬНОМУ БОКОВОМУ ПОЛОЖЕННІ**.



Розмістіть **НЕПРИТОМНОГО** пораненого у **СТАБІЛЬНОМУ БОКОВОМУ ПОЛОЖЕННІ**.



07
Задokumentуйте надану допомогу у Картці пораненого TCCC.



08
Повідомте медичний персонал про надану допомогу.

TACTICAL COMBAT
CASUALTY CARE

TCCC

ALL
SERVICE
MEMBERS
LIFESAVING SKILLS



Committee on
Tactical Combat
Casualty Care
(CoTCCC)

ШВИДКА ОЦІНКА ПОСТРАЖДАЛОГО



ОЦІНІТЬ безпечність місця події (включаючи джерела вогню, струм та небезпеку появи ворога).



ОЦІНІТЬ стан свідомості постраждалого.



ВІЗЬМІТЬ аптечку.

04	M	Масивна кровотеча зупиніть масивну кровотечу
	A	Дихальні шляхи підтримуйте прохідність дихальних шляхів
	R	Дихання оцініть дихання за алгоритмом «БАЧУ,ЧУЮ,ВІДЧУВАЮ»
	C	Кровообіг контролюйте кровообіг постраждалого, не допустіть розвитку шоку.
	H	Гіпотермія попередьте гіпотермію, забезпечуючи тепло і сухість середовища навколо постраждалого.



ВИЗНАЧТЕ наявність інших поранень (в т.ч., поранень очей, травм голови, опіків чи переломів).




ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ надану допомогу у Картці пораненого TCCC.



ПОВІДОМТЕ медичний персонал про надану допомогу.

НАКЛАДАННЯ ТУРНИКЕТА «САТ»



ДІСТАНЬТЕ турнікет «САТ» з індивідуальної аптечки або підсумку.




ПРОТЯГНІТЬ уражену кінцівку крізь петлю, утворену ремнем турнікета.




РОЗМІСТІТЬ турнікет не менше ніж на 5-8 см вище від рани.




Максимально сильно **ЗАТЯГНІТЬ** ремінь турнікета, не залишаючи зазорів.




ЗАКРУЧІЙТЕ вороток для затягування стропи турнікета до моменту зупинки кровотечі.




Завершіть **НАКЛАДАННЯ** джгута для зупинки кровотечі впродовж 1 хв.



ЗАКРІПІТЬ вороток, розмивши його під однією зі скоб фіксатора.



ПРОВЕДІТЬ самоклеючу стрічку між скобами фіксатора та навколо воротка.



ЗАКРІПІТЬ вороток та ремінь турнікета під фіксууючою стрічкою.



ЗАПИШІТЬ час накладання турнікета на фіксуючій стрічці та у Картці пораненого TCCC, або ж на чолі постраждалого.



ПОВІДОМТЕ медичним працівникам інформацію про надану допомогу.

ГЕМОСТАТИЧНИЙ БИНТ / ТАМПУНУВАННЯ РАНИ



ВИЗНАЧТЕ місце поранення та **ЗАБЕЗПЕЧТЕ** доступ до рани.




ВИЗНАЧТЕ місце активної кровотечі та застосуйте прямий тиск.



ДІСТАНЬТЕ бинт зі стерильного упаковки.



Перш за все проведіть **ТАМПУНУВАННЯ** місця найбільш активної кровотечі.




ЗАСТОСУЙТЕ ПРЯМИЙ, СИЛЬНИЙ ТИСК на рану впродовж мінімум 3 хв. до зупинки кровотечі.



ПОВТОРНО ОЦІНІТЬ ефективність зупинки кровотечі.



НАКЛАДІТЬ тиснучий бандаж на рану для фіксації гемостатичного бинта.



ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ надану допомогу у Картці пораненого TCCC.



ПОВІДОМТЕ медичний персонал про надану допомогу.