

# Знеболювальні препарати (довідка)

У цій фармакологічній довідці TCCC подана інформація про застосування ліків виключно на основі Настанов TCCC. Ця інформація не повинна використовуватися для введення даних ліків ніде, окрім як під час надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (на полі бою або в бойовій/тактичній обстановці).


## МОКСИФЛОКСАЦИН

Антибіотик з групи фторхінолонів

Використовується всіма військовослужбовцями, бійцями-рятувальниками та бойовими медиками

Рекомендований при всіх відкритих бойових ранах, якщо борець може прийняти ліки перорально.

<b>ДОЗУВАННЯ:</b>	400 мг на день
<b>ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:</b>	перорально
<b>ПРОТИПОКАЗИ:</b>	Гіперчутливість до хінолонів, печінкова недостатність, сифіліс, аритмії, ішемія або інфаркт міокарда, подовження інтервалу QT, гіпокаліємія, прийом антиаритмічних препаратів класу IA або класу III; при необхідності призначення препарату вагітним, за відсутності альтернативного лікарського засобу, слід враховувати можливі переваги прийому препарату над потенційними ризиками
<b>МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ:</b>	Запаморочення, головний біль, периферична нейропатія, нудота, діарея, біль у животі, блювота, спотворення смаку, порушення функцій печінки, диспепсія та розрив сухожиль.
<b>ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:</b>	Залізо, цинк, антациди, алюміній, магній, кальцій і сукральфат знижують всмоктування; атенолол, цизаприд, еритроміцин, антипсихотики, трициклічні антидепресанти, хінідин, прокаїнамід, аміодарон, соталол можуть подовжувати інтервал QT та призвести до хибнопозитивних результатів скринінгових тестів на опіати.



**ПОЧАТОК/ШК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ:** 1 год/2 год/20-24 год

### ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:

Використайте моксифлоксацин з особистого набору CWMP пораненого бійця. Мінімальний вплив на здатність виконувати бойове завдання.

*Продовження на наступній сторінці...*

# Знеболювальні препарати (довідка)

Продовження...

## ЕРТАПЕНЕМ

Бета-лактамний антибіотик з групи карбапенемів

Використовується лише бойовими медиками

Рекомендований при всіх відкритих бойових ранах, якщо боєць може прийняти ліки перорально.

### ДОЗУВАННЯ:

1 г

### ШЛЯХ(И) ВВЕДЕННЯ:

ВВ, ВК, ВМ

### ПРОТИПОКАЗИ:


Гіперчутливість до карбапенемів, бета-лактамних антибіотиків або місцевих анестетиків амідного типу (напр., лідокаїн); вважається відносно безпечним у вагітних за наявності клінічних показів

### МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ:

Флебіт або тромбоз у місці ін'єкції, астенія, втома, смерть, гарячка, біль у ногах, занепокоєння, зміна психічного стану, запаморочення, головний біль, безсоння, біль у грудях, гіпо- або гіпертензія, тахікардія, набряк, біль у животі, діарея, кислотний рефлюкс, закреп, диспепсія, нудота, блювання, підвищення показників печінкових проб, кашель, задишка, фарингіт, хрипи, порушення дихання, еритема, свербіння і висип

### ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАМИ:

Пробенецид зменшує ниркову екскрецію ертапенему



**ПОЧАТОК/ШК/ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ:** 30 с-5 хв/30 хв-2 год/24 год

**ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В ТАКТИЧНИХ УМОВАХ:** Для ВВ введення - розведіть в 10 мл 0,9% NaCl; для ВМ введення - розведіть в 3,2 мл 1% лідокаїну (без адреналіну). Мінімальний вплив на здатність виконувати бойове завдання.